Faculdade de Ciências Universidade de Lisboa

Dia da Inovação na Pesca e Aquicultura,
Da Ciência para as Empresas.
18 de novembro 2022

mar Mar 2020: faz acontecer com sustentabilidade!
2020
PROGRAMA OPERACIONAL MAR 2020

Cofinanciado por:
REPUBLICA PORTUGUESA
AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO
mar 2020
PORTUGAL 2020
COMISSÃO EUROPEIA

VALOREJET – Aproveitamento de espécies rejeitadas e de baixo valor comercial: valorização de novos produtos com recurso a metodologias inovadoras

MAR-01.03.01-FEAMP-0003

Parceiros:

Ciências
ULisboa

POLITÉCNICO
DE LEIRIA

Cofinanciado por:

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
dos Assuntos Marítimos
e das Pescas

OBJECTIVOS

1. Avaliar o potencial de exploração de espécies de peixes rejeitadas e com baixo valor comercial.
2. Valorizar as espécies rejeitadas ou de baixo valor comercial desenvolvendo novos produtos com valor acrescentado, usando técnicas e processos novos ou melhorados.

Espécies alvo

15 anos

45 cm

0.19 ano⁻¹

222 ovos g⁻¹Pe/emissão

14 anos

41 cm

0.12 ano⁻¹

5431 ovos g⁻¹Pe

11 anos

28 cm

0.17 ano⁻¹

1524 ovos g⁻¹Pe

11 anos

46 cm

0.20 ano⁻¹

1018 ovos g⁻¹Pe

9 anos

40 cm

0.28 ano⁻¹

1813 ovos g⁻¹Pe

15 anos

17 cm

4020 ovos g⁻¹Pe

CONCLUSÕES

1º objectivo

ESPÉCIES DE BAIXO VALOR COMERCIAL

ESPÉCIES REJEITADAS

Novos produtos

Lira frita desidratada

3 meses de validade

Mini-saia frito

18 meses de validade

Ceviche de Choupa

15 dias de validade

Paté de Carapau-negrão fumado

2 meses de validade

Pastéis de Serrão-alecrim

18 meses de validade

CONCLUSÕES

2º objectivo

A concentração de elementos foi semelhante ou mesmo melhor do que as encontradas nas espécies de peixe mais consumidas

A aceitação de cada produto foi muita elevada, sempre superior a 70%, com excepção da cabra-lira desidratada

Elementos tóxicos não foram detectados

Na aparência foram salientadas a cor branca e as estruturas laminares; no odor, as algas marinhas; no sabor, o sabor a mar; na textura, a firmeza

Extensão de *shelf-life* de preparados de peixe fresco oferece um prazo de validade de 5 dias

UROFEED

USO DE UROCORDADOS COMO UMA
FONTE PROTEICA ALTERNATIVA EM
RAÇÕES DE AQUACULTURA

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
dos Assuntos Marítimos
e das Pescas

Objectivos

Testar, pela primeira vez, o potencial de cultivo do abundante urocordado marinho *Ciona intestinalis* como:

- fonte alternativa de proteína para rações de aquacultura

Contribuir para:

- diminuição da utilização da farinha de peixe
- redução dos custos da produção de peixes carnívoros

Metodologias (1ª fase)

Amostras do urocordado *Ciona intestinalis* colhidas em estruturas fixas (docas, plataformas, etc.)

- Rias de Aveiro e Formosa
- Lagoa de Albufeira.

Metodologias (1ª fase)

Ensaio realizado no
Laboratório Marítimo da
Guia - MARE / FCUL

(a 14°C, 16°C, 18°C, 20°C, 22°C) durante 30 semanas
(~210 dias; durante o primeiro ano do projeto).

Resultados (1ª fase)

Registaram-se taxas:

- . Crescimento;
- . Filtração;
- . Sobrevivência;

Resultados

Efetuarão-se análises de:

- . Composição química aprox.
- . Ácidos gordos
- . Aminoácidos
- . Minerais

Metodologias (2ª fase)

Produção de granulado/farinha de *Ciona intestinalis* (CI) e colocação em 3 dietas experimentais formuladas para serem **isoproteicas** e **isolipídicas**

CI substituí em 25% (Grupo A) e 50% (Grupo B) a farinha/óleo de peixe da dieta controlo

Tabela 6. Composição de ingredientes e análise proximal das dietas experimentais.

Ingredientes (g/kg)	Controlo	Grupo A	Grupo B
Farinha de peixe 70 LT	400	270	220
Ervilha, concentrado proteico	55	110	104
CI farinha	0	150	200
Glúten Trigo	55	69	100
Farinha de trigo	310	240	255
Óleo de peixe	70	45	25
Óleo de palma	70	75	55
Suplementos Min. & Vit. *	20	20	20
Binder	20	20	20
Metionina	0	1	1
Composição proximal			
Cinza (%)	9,73	9,84	10,23
Proteína Bruta (%)	41,87	42,74	42,13
Gordura Bruta (%)	18,73	18,15	18,63
Energia Bruta (Kj/g)	22,66	22,49	21,87

* mix mineral (g/kg): Ca HPO₄ · 2H₂O, 27.5; K₂HPO₄, 19.0; NaCl, 6.1; MgO, 2.0; FeCO₃, 1.75; KI, 0.15; ZnO, 0.11; OMnO, 0.07; CuSO₄, 0.02; selenito de sódio, 0.002. Mix vitamínico (mg/kg): tiamina HCl, 40; riboflavina, 40; piridoxina HCl, 40; niacina, 300; pantotenato de cálcio, 100; ácido fólico, 5; biotina, 3; cloreto de colina, 5000; mio-inositol, 1000; ácido ascórbico, 2000; acetato a-tocoferol, 250; menadiona, 90; vit. A, 40,000 IU/kg diet; vit. D3, 2500 IU/kg diet.

Resultados (2ª fase)

- . Avaliou-se:
- . Taxa de crescimento específico (TCE)
- . Índice de conversão alimentar (ICA)
- . Índice de condição (IC)
- . Índice hepatossomático (IHS)
- . Índice intestinal ou índice somático intestinal (II)

Resultados (2ª fase)

Tal como com a *Ciona intestinalis*,
efetuaram-se análises químicas no
peixes:

- . Composição química aproximada
- . Ácidos gordos

Conclusões

- *Ciona intestinalis* revelou ter um perfil balanceado em aminoácidos totais, ácidos gordos e minerais
- As dietas testadas (controlo, Grupo A e Grupo B) não induziram nenhuma diferenças significativas em relação às taxas de crescimento e outros índices de condição
- A substituição parcial da farinha de peixe pela deste urocordado foi bem-sucedida, uma vez que não afetou o crescimento, os parâmetros químicos, bioquímicos e sensoriais da espécie de peixe estudada

Todavia,

- Do ponto de vista químico é importante realçar que este urocordado revelou teores de humidade muito elevados, entre 91% e 95% peso húmido
- Do ponto de vista logístico, esta característica química levanta muitos problemas na produção de biomassa em grande escala, e se tal é economicamente competitivo
- É importante frisar que estes urocordados são filtradores, e como tal, competem diretamente com outros recursos haliêuticos, nomeadamente bivalves (e.g. mexilhão, o que pode provocar grandes perdas económicas na produção destes moluscos.

Project

Team

Outcomes

Contacts

pt en

○ **Projeto AQUASADO** teve com objectivo a **avaliação das condições ambientais** do Estuário do Sado, de forma a **promover a aquacultura sustentável de ostras**.

AQUASADO

Promote Sustainable Aquaculture in the Sado Estuary

Website: <http://aquasado.pt/en/project>

Contacto: Ana Brito - acbrito@fc.ul.pt

Questões prioritárias:

- i. Quais as variações sazonais e de longo-prazo?
- ii. Qual o efeito da produção de ostra no estuário e vice-versa?
- iii. Pode a produção de ostra ser aumentada sem causar alterações não desejáveis no ecossistema?

CRASSOREAB

Projecto de Reabilitação da Ostra Portuguesa

MAR-02.01.01-FEAMP-0050

PI: Ana Amorim (MARE, FCUL)

aaferreira@fc.ul.pt

<https://crassoreab.viaoceanica.com>

Objetivos específicos

- Avaliar o potencial de diferentes espécies de **microalgas autóctones** para o cultivo em maternidade dos diferentes estados de desenvolvimento da ostra;
 - Otimizar a produção de ostra portuguesa em **maternidade**;
-
- Contribuir para o desenvolvimento sustentável da aquacultura em Portugal
 - Contribuir para a preservação do património genético autóctone.

Cofinanciado por:

Entidade Proponente:

Entidades Parceiras:

NEWCUMBER – AVANÇOS PARA O CULTIVO SUSTENTÁVEL DE PEPINOS-DO-MAR

Objectivos e concretizações:

Recurso nacional de elevado valor com procura internacional

1. Conhecer e descrever a ecologia e biologia das espécies de valor comercial na costa portuguesa (no PNArrábida e RNES);
2. Arranque no desenvolvimento da aquacultura de pepinos do mar em Portugal (inexistente na Europa) - aumento da oferta em produção, para diminuir a exploração das populações naturais;
3. Proteger o recurso, oferecendo bases biológicas para a sustentação das populações naturais (e.g. para desenvolvimento de legislação);
4. Sensibilização do público e entidades com jurisdição na gestão de zonas marinhas para a importância destes equinodermes e necessidade de preservação.

Website: seacucumber.eu

Coordenação: **Pedro M. Félix** (pmfelix@fc.ul.pt)

NIPOGES - Estado atual das populações de amêijoa-japonesa da Ria de Aveiro, lagoa de Óbidos e estuários do Tejo e Sado - bases científicas para uma gestão sustentável do recurso

IR: Paula Chainho (pmchainho@fc.ul.pt)

Website:
ameijoajaponesa.com

	Ria de Aveiro	Lagoa de Óbidos	Estuário do Tejo	Estuário do Sado	Total
Número de apanhadores	611	61	1128	195	1995
g / m ²	14,9	5,1	17,3	3,2	10,1 (média)
Ton / ano	1121	36	5617	763	7 537
€ / ano	6 6896445	224 110	17 666 505	3 069 211	87 856 271

Entidade beneficiária Ciências ULisboa

COASTNET
COASTAL MONITORING NETWORK

Rede Portuguesa de Monitorização Costeira

- 1. Sistema de Detecção Remota Costeira** - Centro de processamento de dados de satélite
- 2. Sistema de Monitorização Ambiental em Contínuo** - Sistema de sondas e sensores para medição de variáveis ambientais
- 3. Rede Nacional de Recetores de Biotelemetria Aquática** - Rede de detetores de telemetria acústica
- 4. Geoportal** - Ferramenta para integração e processamento dos dados recolhidos (e históricos), e sua disponibilização para a comunidade científica, administração pública, empresas e sociedade em geral

www.coastnet.pt • coastnet@mare-centre.pt

Obrigado pela vossa
atenção!